



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana



V00038946

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	Sig. zn.: 20103
Prejeto: 9.2.2016	Št. prilog:
Št. zad.: 3303-10/2011	
V seznanitev:	Vrednost:

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

Številka: U34330-17/2014/14

Datum: 04.02.2016

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana, Dunajska c. 22, izdaja na vlogo **Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana**, v zadevi izdaje dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin na podlagi 53. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24.11.2009 str. 1; v nadalnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES), 7. člena Uredbe o izvajaju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) in 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12; ZFfS-1; v nadalnjem besedilu: ZFfS), naslednje

DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE V ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN

1. **Dovolita se promet ter omejena in nadzorovana uporaba** fitofarmacevtskega sredstva (v nadalnjem besedilu: FFS) **ADMIRAL 10 EC** (*piriproksifen* 100 g/L), ki ga proizvaja Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., ki ga v Republiki Sloveniji zastopa podjetje Chemtura Europe d.o.o., Videm pri Ptalu 7a, Videm pri Ptalu, in distribuira Hmezad Exim d.o.o., Vrečerjeva 14, Žalec (v nadalnjem besedilu: distributer).
2. UPORABA: FFS ADMIRAL 10 EC je insekticid z dolgim rezistentnim ovicidnim in larvicidnim načinom delovanja, ki zavira razvoj začetnih faz žuželk. Uporablja se:
 - za omejevanje številnosti populacije **ameriškega kaparja** (*Diaspidiotus (Quadraspis) perniciosus*) **na pečkarjih (jablanah in hruškah)** v odmerku 40 mL/hL vode v fenološki fazi pred cvetenjem jablan in hrušk (BBCH 07-09), pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,32 L/ha;
 - za omejevanje številnosti populacije **mrvovatega kaparja** (*Pseudaulacaspis pentagona*) **na koščičarjih (breskve, marelice in nektarine)** v odmerku 35 do 40 mL/hL vode v fenološki fazi pred cvetenjem breskev, marelice in nektarin, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami (BBCH 09) oziroma v razvojnem stadiju oplojenih samic, pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,32 L/ha.

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi. Vsa tretiranja morajo biti izvedena pred cvetenjem tretiranih rastlin. Natančen čas uporabe sredstva napove opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.

KARENCA: Karenca za jablane, hruške, breskve, nektarine in marelice je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *piriproksifen* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

OZNAČEVANJE: V delu, ki določa razvrstitev in označitev FFS v skladu z novimi predpisi (po CLP) etiketa ni bila preverjena, zato je imetnik dovoljenja dolžan FFS ADMIRAL 10 EC označiti v skladu s podatki, ki jih pridobi pri imetniku registracije. Imetnik dovoljenja je dolžan, da nevarnost in sestavo FFS vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost FFS na etiketi mora uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji tega dovoljenja. Imetnik dovoljenja mora o spremembah obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opaševalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti oziroma se cvetočo podrast odstrani. Potrebno je preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Pri tretiraju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

VARNOST PRI DELU: Pri pripravi in uporabi sredstva je treba nositi zaščitno obleko, očala/ščitnik za obraz, pokrivalo s širokimi krajci, nepremočljive rokavice in trpežno obutev.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na njej popolnoma posuši.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljjanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z veliko vodo in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba kontaminirano obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpere s čisto vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo, etiketo ali varnostni list. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar.

Napotki za zdravnika: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenske funkcije.

3. FFS ADMIRAL 10 EC smejo v Republiki Sloveniji uporabljati pri MKGP registrirani pridelovalci jabolk, hrušk, marelic, breskev in nektarin, ki imajo nasade napadene z škodljivimi organizmi, navedenimi v 2. točki tega izreka, in ki imajo veljavno potrdilo o

pridobitvi znanj iz fitomedicine.

5. KOLIČINA FFS: do 200 L.
6. MESTO IN NAČIN PRODAJE: FFS se lahko prodaja neposredno preko distributerja samo zanim kupcem iz 4. točke tega izreka. FFS ne sme biti v prosti prodaji. FFS se proda samo na zahtevo pridelovalcev iz 4. točke tega izreka. Distributer navedenega FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu. EMBALAŽA: Dajanje sredstva v promet je dovoljeno za namene, določene v tem dovoljenju, v originalni embalaži.
ETIKETA: FFS mora biti opremljeno z etiketo z navodilom za uporabo, ki je v prilogi in je sestavni del tega dovoljenja.
7. Distributer navedenega FFS lahko evidenco iz prejšnje točke tega izreka uporabi zgolj in samo za namen poročanja Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8. Distributer navedenega FFS mora ob prodaji navedenega FFS vsakega kupca pisno seznaniti z vsemi pogoji uporabe, ki so navedeni v izreku tega dovoljenja.
9. Registrirani pridelovalci iz 4. točke tega izreka, ki bodo uporabili FFS ADMIRAL 10 EC, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljenih vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom ameriškega oziroma murvovega kaparja v tretiranih nasadih. Uporabniki FFS morajo evidenco poslati distributerju najpozneje **v roku 30 dni** po izteku veljavnosti tega dovoljenja.
10. Najpozneje **v roku 60 dni** po izteku veljavnosti tega dovoljenja mora distributer Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poslati skupno poročilo o prometu in uporabi FFS, ki vsebuje podatke iz evidence o prodaji in uporabi, ki so navedeni v 6. in 9. točki tega izreka.
11. Dovoljenje za nujne primere za uporabo v intenzivnih nasadih jablan, hrušk, marellic, breskev in nektarin pridelovalcev iz 4. točke tega izreka se izda za 120 dni in **velja od 4.2.2016 do 4.6.2016**.

O b r a z l o ž i t e v

Vlagatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ul. 6, Ljubljana, je dne 21.01.2016 vložil vlogo št. U34330-17/2014/13 za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo FFS ADMIRAL 10 EC (*piriproksifen* 100 g/L), ki ga proizvaja Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., v Republiki Sloveniji zastopa podjetje Chemtura Europe d.o.o., Videm pri Ptaju 7a, Videm pri Ptaju, in distribuira podjetje Hmezad Exim d.o.o., Vrečerjeva 14, Žalec. Vlagatelj je vlogi priložil strokovno utemeljitev, da je v letu 2016 ponovno nujna uporaba navedenega sredstva za zatiranje ameriškega kaparja (*Diaspidiotus (Quadraspis) perniciosus*) in murvovega kaparja (*Pseudaulacaspis pentagona*) v nasadih jablan, hrušk, breskev, marellic, nektarin ter ameriških borovnic. Gospodarska škoda v preteklih letih je bila zaradi obsega napada navedenih škodljivcev v nekaterih nasadih zelo velika, za ta namen pa ni v Republiki Sloveniji registrirano nobeno FFS.

Pristojni organ je pregledal predloženo in na EU nivoju dostopno dokumentacijo. Na razpolago ni podatkov, ki bi dokazovali varno uporabo navedenega sredstva na ameriških borovnicah, zato je bil v zvezi s tem vlagatelj pozvan, da podatke, če z njimi razpolaga, predloži. Ker vlagatelj in imetnik registracije s podatki o uporabi FFS ADMIRAL 10 EC na ameriških

borovnicah ne razpolagata, je vlagatelj dne 03.02.2016 od vloge v tem delu odstopil.


Predložena dokumentacija je v skladu s 53. členom Uredbe 1107/2009/ES in 7. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/2011). Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja ameriški in murkov kapar na podlagi 53. člena Uredbe 1107/2009/ES, 7. člena Uredbe o izvajanju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) in 5. člena ZFFS izdala dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS ADMIRAL 10 EC pod pogoji, kot je razvidno iz izreka tega dovoljenja. Dovoljenje za nujne primere za uporabo v intenzivnih nasadih jablan, hrušk, marelic in breskev, nektarin se izda za 120 dni. FFS ADMIRAL 10 EC smejo v Republiki Sloveniji uporabljati pri MKGP registrirani pridelovalci jabolk, hrušk, marelic, breskev in nektarin. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lahko na podlagi skupnega poročila o prometu in uporabi FFS, ki vsebuje podatke iz evidence o prodaji in uporabi, ki so navedeni v 6. in 9. točki izreka tega dovoljenja, prejetega s strani distributerja, preveri upravičenost nakupa in uporabe navedenega FFS v registru pridelovalcev jabolk, hrušk, marelic, breskev in nektarin.


Dovoljenje je izdano na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10 in 82/13).

STROŠKI: Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) v vrednosti 22,66 EUR je plačana. Stroški postopka izdaje dovoljenja za nujne primere v skladu s VI. točko priloge 2 Uredbe o izvajanju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) v višini 700,00 EUR so plačani.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 15 dneh od vročitve tega dovoljenja. Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal dovoljenje, na naslov: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, in sicer pisno ali ustno na zapisnik ali pa priporočeno po pošti. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,12 EUR po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5).

Postopek vodila:


Tatjana Bučar
podsekretarka




dr. Janez Posedi
generalni direktor

Poslano:

1. ZUP - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ul. 6, 1000 Ljubljana;
2. RI - Hmezad Exim d.o.o., Vrečerjeva 14, 3310 Žalec;
3. elektronsko - gp-ursk.mz@gov.si (Urad RS za kemikalije);
4. elektronsko – UVHVVR – FSI;
5. arhiv, tu.

Priloga (etiketa FFS ADMIRAL 10 EC):

Admiral® 10EC



INSEKTICID - sredstvo za zatiranje rastlinskih škodljivcev
formulirano v obliki koncentrata za emulzijo (EC)

Vsebuje: piriproksifen 100 g/L (10 % w/w)

Cas st.: 95737-68-1

Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlavor/ razpršila. Nosiš zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob požaru: Za gašenje se uporabi suhi pesek, suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol. P R I STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnavajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

NEVARNO!



Proizvajalec:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.



Distributer: Hmezad exim d.d., Vrečerjeva 14, 3310 Žalec,
Tel.: +386(0)3 713-49-14, www.hmezad.si



Pooblaščeni zastopnik: Chemtura Europe d.o.o.,
Videm pri Ptaju 7a, Videm pri Ptaju

Vsebina: ... L

Pogoji skladisčenja:

Sredstvo shranjujemo v suhem, dobro zračnem prostoru, v originalno zaprti embalaži, pri sobni temperaturi, ločeno od hrane pijače in krmil ter nedostopno otrokom.

»Pred uporabo preberite priloženo navodilo!« »Pripravek je namenjen izključno za tržne pridelovalce!«

»Sredstvo se lahko prodaja samo neposredno preko distributerja in ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine!«

»Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena!«

SI-AD1-024-02b (021)

Način delovanja:

Za Admiral 10 EC je značilno dolgo rezistentno insekticidno delovanje z ovicidnim in larvicičnim načinom delovanja. Aktivna snov piriproksifen s svojim juvenilnim hormonskim delovanjem zavira razvoj enakokrilcev (Homoptera) v začetni fazi razvoja. Juvenilni hormon je snov, ki jo žuželka v naravi proizvaja sama, in je nujno potreben za popoln razvoj žuželke. S tretiranjem v priporočenem času razvoja škodljivcev vplivamo na neravnovesje fizioloških procesov razvoja organizmov. Vpliv pripravka glede na razvojni stadij škodljivca:

1. **stadij jajčeca:** Admiral 10 EC povzroči inhibicijo embriogeneze, kar prepreči razvoj embria v že odloženem jajčecu.
2. **priči stadij larve:** v tem stadiju pripravek povzroči močno porušenje ravnovesja hormonov in posledično s tem, povzročijo nenormalno število larvalnih stadijev, kateri se v nadalnjem razvoju nenormalno razvijejo.
3. **zadnji larvalni stadij razvoja:** v tej fazi razvoja lahko povzroči še dodatne vmesne razvojne oblike med larvo in imagom, ki pa ne vodijo v razvoj odraslega osebka.
4. **obrasla žuželka:** tretiranje v tej fazi nima nobenega direktnega vpliva na delovanje škodljivca.

Uporaba:

ADMIRAL 10 EC je insekticid z dolgim rezistentnim ovicidnim in larvicičnim načinom delovanja, ki zavira razvoj začetnih faz žuželk Uporabila se:

na pečkarilih: (jablanah in hruškah) za omejevanje številnosti populacije ameriškega kaparja (*Quadrastriolus perniciosus*) v odmerku 40 ml/Hl. vode v fenološki fazi pred cvetenjem jablan in hrušk (BBCH 07-09), pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, oziroma v največjem dovoljenjem odmerku 0,32 L/ha,

na koščičarjih: (breskve, marelice in nektarine) za omejevanje številnosti populacije murvovegakaparja (*Pseudanthonomus pentagona*) v odmerku 35-40 ml/Hl. vode v fenološki fazi pred cvetenjem, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami (BBCH 09) oziroma v razvojnem stadiju oplojenih samic, pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha oziroma največjem dovoljenjem odmerku 0,32 L/ha.

OPOZORILA:

S sredstvom se sme na istem zemljишču tretirati največ enkrat v eni rastni dobi. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprševalcev ne tretiramo med cvetenjem gojenih rastlin in podrstji oziroma se cetečo podrast odstrani. Natančen način uporabe napove opazovalno napovedovalna služba varstva rastlin.

Varovanje okolja:

Pri tretirjanju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlortsne širine od meja brega voda 1. reda in 5 m od meja brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin): Pripravek ne povzroči poškodb na gojenih rastlinah (ni fitotsišen), če ga uporabljam v skladu z navodili.

Mešanje (kompatibilnost): Pripravek se ne uporablja v mešanici z drugimi sredstvi.

Karenca: Karenca za jablane, hruške, breskve, nektarine in marelice je zagotovljena s časom uporabe.

Nevarnost in varnostni ukrepi:

Admiral 10 EC draži kožo in v primeru zaužitja lahko povzroči poškodbo plju. Je zelo strpen za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Pri delu je potrebno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki veljajo za delo s pripravki za varstvo rastlin. Pri pripravi in uporabi sredstva je potrebno nositi zaščitno obliko, očala/ščitnik za obraz, pokrivalo s širokimi krajevi, nepremočljive rokavice in treپnja obutev. Med delom ne smemo jesti, pitи in kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev prenehamo z delom in ukrepamo po navodilih prve pomoči. Po delu se temeljito umijemo in preoblečemo.

Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škopivo na njih popolnoma posuši.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob negodi:

Spoštni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastaja dihanja in/ali zastosta srca se izvaja oživljavanje po standardnemu ABC postopku: sprostite dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnik in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodila za uporabo.

Pri vdihavanju: Raynati se je treba v skladu s spoštnimi ukrepi.

Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano oblike in obutve, kožo se temeljito umije z veliko vode in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno kontaminirano obliko oprati.

Stik z očmi: S palem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpere s čisto vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče. V primeru draženja se treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik in se mu pokaže embalažo, etiketo ali varnostni list.

Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar piti.

Napotki za zdravnika: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidotu ni. Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenske funkcije.

Priprava sredstva za uporabo:

Odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škopilnice napolnjen s polovico potrebnih količin vode. Nato ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebnih količin.

Varnostni ukrepi v primeru menamernega izpusta v okolje:

V primeru nesreče pri prevozu takoj ugasnemo motor vozila, obvestimo center za obveščanje 112, zavarujemo mesto nesreče in preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Uporabimo primerno zaščitno opremo. Ponesrečenim osebam nudimo prvo pomoč, sicer pa ukrepamo kot pri nezgodbi v zaprtem prostoru. Pri večjih razlijtjih odstranimo tudi vrhnjo plast zemlje. V zaprtiem prostoru damo poškodovano embalažo v ustrezno označeno večjo embalažo, po razlitem pripravku potresemo absorpcjsko sredstvo (pesek, zemljo, žaganje). Absorbirani pripravek zberemo v ustrezno označene posode ter oddamo v zbirnilne posebnih odpadkov pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Tla očistimo z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo, da ne onesnažimo odvodnih kanalov, podtalnice, tekočih in stojecih voda. V primeru požara gasimo s prahom, peno, CO₂ ali z razpršeno vodo. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini; pri gašenju v zaprtem prostoru moramo nositi dihalni aparat.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo:

Morebitne ostanke škopilne brozge razredčimo v razmerju 1:10 in jih enakomerno porabimo na že tretirani površini. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja zlijemo v škopilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom. Sredstvo katemu je potekel rok uporabnosti moramo oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov, kot nam narekuje zakonodaja, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki.

Številka dovoljenja za nojne prime:

MKGP, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, št. U34330-17/2014/14 z dne ...

Navedena uporaba je v skladu z dovoljenjem za uporabo.

Spošne opombe:

Priovajalec jamči za kakovost sredstva dokler je v izvirno zaprti embalaži. Za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja priovajalec ne odgovarja.



3 830048 660079 >