

SEZNAM HRBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2023

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE
STOMP AQUA Pendimetalin 45,5% Datum veljavnosti do 31.8.2023!	3,3 l/ha	Pred vznikom do 4. lista kuruze (BBCH 14) in faze 2 listov plevelov. Zatira travne in nekat. širokolistne plevelle.	Ob uporabi naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadelati!
SHARPEN PLUS (staro ime: SHARPEN 40 SC) Pendimetalin 40% Datum veljavnosti do 1.5.2023!	2,5 – 4 l/ha	Po setvi, vendar pred vznikom kuruze (BBCH 00-09). Za travne in na nekatere širokolistne plevelle.	Ne sme se ga uporabiti v času vznika kuruze, seme mora biti dobro pokrito. Odmerek prilagoditi zapleveljenosti! <u>Slabo zatira</u> slak, njivsko preslico, divji sirek in okroglo ostrico. Netretiran pas 30m od meje brega voda 1. in 2. reda!
SHARPEN 33 EC Pendimetalin 33% Datum veljavnosti do 1.5.2023!	3 – 5 l/ha	Po setvi, vendar pred vznikom kuruze (BBCH 00-09). Zatira enoletne ozkolistne in širokolistne plevelle.	<u>Slabo zatira</u> slak, njivsko preslico, divji sirek in okroglo ostrico. Netretiran pas 30m od meje brega voda 1. in 2. reda! Odmerek prilagoditi zapleveljenosti!
FRONTIER X2 * Dimetenamid-P 72%	1 – 1,4 l/ha	<u>Pred setvijo</u> z inkorporacijo v globino do 5 cm ali <u>po setvi</u> pred vznikom plevela. Deluje tudi na vznikajoče plevelle.	Za enoletne travne plevelle, delno širokolistne: ščir, plazeča lakota, kamilice, nj. spominčica, breskova dresen, pasje zelišče. Uporaba na lahkkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana! Netretiran pas 15m od meje voda 1. in 2. reda. Boljši v kombinaciji.
DUAL GOLD 960 EC* = EFICA 960 SC* Metolaklor-s 96 % Oba datum veljavnosti do 31.7.2023!	1 – 1,5 l/ha <u>pred vznikom</u> oz. <u>po vzniku:</u> 1 – 1,3 l/ha v mešanici z 0,2-0,25 L/ha prip. na osnovi mezotriona	Pred in po vzniku do 2. listov kuruze. Za enoletne ozkolistne, delno širokolistne plevelle.	Odmereke prilagoditi tlem! Zatira: nav. kostrebo, krvavordečo in malo srakonjo, muhviče, golo proso, nav. zvezdico, drobnocvetni rogovilček. Ni za kislja tla pod pH 5,2. Na VVO le po vzniku posevka!
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC* Metolaklor-s 31,25% + terbutilazin 18,75% Datum veljavnosti do 31.7.2023!	4 – 4,5 l/ha Odmereke prilagoditi tlem!	Uporaba: - <u>pred setvijo</u> z zadelavo s predsetvenikom na globino 5cm, - <u>po setvi</u> , pred vznikom plevela in kuruze - <u>po vzniku plevela in kuruze</u> do 2. lista kuruze.	Na VVO le po vzniku posevka! Zatira travne in širokolistne plevelle. <u>Učinkovito zatira ambrozijo.</u> Priporočena mešanica s Callisto 480 SC! Na istem zemljišču se tretira največ enkrat vsako 3. leto.

KOBAN TX * Petoksamid 30% + terbutilazin 18,75% Datum veljavnosti do 31.12.2023!	4 l/ha	Pred vznikom koruze do faze, ko koleoptila prodre iz zemlje (BBCH 00-09), ali po vzniku do faze ko so 4 listi razviti (BBCH 10-14). Za širokolistne in ozkolistne plevela.	Ob uporabi pred vznikom je priporočljivo, da so tla vlažna. V primeru izsušenih tal se tretiranje odsvetuje. Slabo deluje na slak. Varnostni pas 10 m od meje brega voda 2. reda. Kolobarne omejitve!
MERLIN FLEXX Izoksafutol 24 %	0,3 l/ha pred vznikom oz. 0,4 l/ha po vzniku	Pred in po vzniku do največ 3. lista koruze. Za enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevela.	Seme mora biti dobro pokrito. Dobro zatira: baržunasti oslez, belo metliko, pasje zelišče, divji sirek in ščavjelistno dresen. Varnostni pas 10 m od meje brega voda 2. reda. Kolobarne omejitve!
SUCCESSOR 600* Petoksamid 60% Datum veljavnosti do 30.11.2023!	2 l/ha	Pred vznikom koruze ob zadostni talni vlažnosti in po vzniku koruze do 4. lista (BBCH 14). Zatira travne in širokolistne plevela.	Potrebna zadostna talna vlaga. Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 2. reda. Uporaba na površinah kjer je možno spiranje zaradi dežja ali namakanja ni dovoljena.
LUMAX * Mezotrion 3,75% + S-metolaklor 37,5% + terbutilazin 12,5% Datum veljavnosti do 31.7.2023!	3 – 4 l/ha	Pred vznikom do največ 4. lista koruze! Za enoletne širokolistne in travne plevela.	Odmerke prilagoditi tlem - nižji odmerki na lahkih tleh. Pred vznikom samo izven VVO. Na isti površini največ enkrat vsako 3. leto! Učinkovito zatira ambrozijo.
LUMAX H 537,5 SE * Mezotrion 3,75% + S-metolaklor 31,25% + terbutilazin 18,75% Datum veljavnosti do 31.7.2023!	3 – 4 l/ha	Pred vznikom do največ 4. lista koruze! Za enoletne širokolistne in travne plevela.	Nižji odmerek na lahkih tleh. Učinkovito zatira ščire, slak, njiv. gorjušico, kamilice, ambrozijo... Slabše zatira muhič in slabo divji sirek. Na isti površini največ enkrat vsako 3. leto! Netretiran pas 10 m od meje voda 2. reda. Omejitve pri kolobarju!
ADENGO Izoksafutol 22,5% + tienkarbazon metil 9%	0,44 l/ha	Pred ali po vzniku koruze do 3. lista koruze (BBCH 00 - 13). Za enoletne široko in ozkolistne plevela.	Zatira: nav. lobodo, metliko, rogoviček, kamilico, spominčico, dresni, pasje zelišče, nav. zvezdico, zeleni muhič, gluhi oves, enoletno latovko nav. slakovec, kostrebo... Pred setvijo naslednje kulture, je treba tla globoko preorati.
CALLISTO 480 SC Mezotrion 48%	0,25 – 0,3 l/ha pred vznikom oz. 0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo	Po setvi in pred vznikom koruze in plevela ali po vzniku do faze največ 8 listov koruze. Za širokolistne plevela in navadno kostrebo.	Tudi za zatiranje preslice in ambrozije. Kolobarne omejitve - spomladi po globokem oranju se lahko seje vse kulture.

OSORNO 480 Mezotrion 48%	0,2 l/ha	Pred vznikom od faze, ko je zrno suho, do faze, ko koleoptila prodre iz zrna (BBCH 00-08). Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih ozkolistnih plevelov.	Zatira: pravo kamilico, metlike, nav. plešec, slakovec, nj. mošnjak in vijolica, zmanjšuje zapleveljenost z belo metliko, ščiro, pasjim zeliščem... Kolobarne omejitve!
CALARIS PRO* Mezotrion 5% + terbutilazin 32,6% Datum veljavnosti: 31.12.2023	2,0 – 2,3 l/ha	Po setvi, pred vznikom ali po vzniku koruze do faze, ko je razvit 4. list (BBCH 00-14). Za enoletne širokolistne (tudi ambrozija) in nekatere ozkolistne plevela.	Na isti površini največ enkrat vsako 3. leto! V primeru običajnega spravila koruze se priporoča globoko oranje . Netretiran pas 10 m od meje voda 2. reda.
CLINIC XTREME* (staro ime CREDIT XTREME) glifosat -izopropilamino soli 40,08 % + glifosat - kalijeva sol 29,77% Datum veljavnosti: 15.12.2023	1,33 – 4,0 l/ha v času pred setvijo 1,2 – 2,0 L/ha po setvi, vendar pred vznikom	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela.	Ne sme se tretirati v kolikor se v naslednjih 6 urah pričakujejo padavine ali v vročem in vetrovnem vremenu.

*Pripravkov, ki so označeni z * ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) in v ukrepu POS_FFSV; Pripravili: A. Poženel, KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba in J. Dariž, KGZS, KGZ Nova Gorica, Oddelek za varstvo rastlin
 Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 23.3.2023, MKGP, URSVHVVR*