



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 13/04/2011

Napotki za varstvo vinske trte z dne 13. april 2011

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je bil v zadnjih dneh predvsem zaradi visokih dnevnih temperatur zelo hiter. Ravno tako je razvoj vinske trte zelo odvisen od lege nasada in sorte. Nekatere sorte (Chardonnay, Zelen, Vitovska grganja), so že daljše od 15 cm (fenofaza F po Baggiolini-ju.), nekatere pozno odganjajoče sorte (npr. Malvazija), so še v fazi D-E po Baggiolini-ju.

Proti **črni pegavosti** škropimo le v tistih vinogradih, kjer se je bolezen v lanskem letu zelo razširila in ocenjujemo, da bi lahko letos povzročila večji izpad pridelka.

V primeru napovedanega deževnega vremena proti črni pegavosti vinske tre uporabimo kontaktne fungicide kot so: **Antracol v 0,2% konc.**, **Antracol WG 70 v 0,2% konc.**, **Bravo 500 SC v 0,3% konc.**, **Folpan 80 WDG v 0,15% konc.**, **Polyram DG v 0,30% konc.**, **Delan 700 WG v 0,075% konc.**, **Quadris v 0,10% konc.** ali **Stroby WG v 0,009 % konc.**.

Pripraveka **Quadris** in **Stroby WG** delujeta tudi proti oidiju vinske tre.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina