

**REGISTRIRANI FUNGICIDI V ŽITIH V LETU 2018**

| <b>PRIPRAVEK</b>  | <b>ODMER<br/>EK</b>       | <b>UPORAB<br/>A NA</b> | <b>K</b>  | <b>DELUJE NA/OPOMBE</b>  |
|---|---------------------------|------------------------|-----------|--|
| <b>ACANTO PLUS*</b><br>Ciprokonazol 8% +<br>pikoksistrobin 20%      | <b>1,0 l/ha</b>           | J, O, PŠ,<br>R, T      | ČU        | Pšenična listna pegavost, pšenična rja,<br>rjavenje pšeničnih plev, rumena rja,<br>ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta<br>pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena<br>rja, rje iz rodu Puccinia<br>ACANTO PLUS: Zaloge v uporabi do<br>30.11.2018                   |
| <b>AMISTAR<br/>EXTRA*</b><br>Azoksistrobin 20%<br>+ ciprokonazol 8% | <b>0,6 - 1,0<br/>l/ha</b> | J, O, PŠ,<br>R, T      | 45<br>dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice,<br>pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih<br>plev, rje iz rodu Puccinia, snežna plesen,<br>žitna pepelovka, ječmenov listni ožig,<br>ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova<br>rja, ovsova rja, ržena rja, pšenična rja |
| <b>AMISTAR OPTI *</b><br>Azoksistrobin 8% +<br>klorotalonil 40%     | <b>2,5 l/ha</b>           | J, PŠ, T               | ČU        | helminosporiozna pegavost pšenice,<br>pšenična listna pegavost, pšenična rja<br>ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta<br>pegavost, ječmen. ramularijska pegavost,<br>ječmen. rja, listne pegavosti iz rodu Septoria   |
| <b>ARCHER MAX*</b><br>Fenopropidin 45% +<br>propikonazol 12,5%      | <b>1,0 l/ha</b>           | J, PŠ, R, T            | 42<br>dni | helminosporiozna pegavost pšenice,<br>pšenična listna pegavost, pšenična rja,<br>rjavenje pšeničnih plev, žitna pepelovka,<br>ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta<br>pegavost, ječmenova rja, ržena rja   |
| <b>ARTEA PLUS*</b><br>Ciprokonazol 16% +<br>propikonazol 25%        | <b>0,4 - 0,5<br/>l/ha</b> | J, PŠ, T               | 45<br>dni | Pšenična listna pegavost, rje iz rodu<br>Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova<br>rja, pšenična rja, rumena rja<br>Zaloge v uporabi do 14.11.2018.   |
| <b>AVOCA SUPER*</b><br>Ciprokonazol 4% +<br>klorotalonil 37,5%      | <b>2,0 l/ha</b>           | PŠ                     | 42<br>dni | Pšenična listna pegavost, pšenična rja,<br>rumena rja<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!<br>Datum veljavnosti 31.10.2019.  |
| <b>PROCEED *</b><br>Ciprokonazol 4% +<br>klorotalonil 37,5%         | <b>2,0 l/ha</b>           | PŠ                     | 42<br>dni | Pšenična listna pegavost, pšenična rja,<br>rumena rja, ječmenov listni ožig<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!<br>Datum veljavnosti 31.10.2019   |
| <b>BUMPER 25 EC*</b><br>Propikonazol 25%                            | <b>0,5 l/ha</b>           | J, PŠ, R               | 35<br>dni | Pšenična rja, rje iz rodu Puccinia, rumena<br>rja, ječmenova rja, ržena rja  |
| <b>PROPI 25 EC*</b><br>Propikonazol 25%                             | <b>0,5 l/ha</b>           | J, O, PŠ,<br>R         | 35<br>dni | Pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rje iz<br>rodu Puccinia, rumena rja, glive iz rodu<br>Cladosporium, ječmenova rja, pepelovke iz<br>rodu Erysiphe, ržena pepelovka, ržena rja<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!   |

|   |                        |             |        |  |
|---|------------------------|-------------|--------|--|
| <b>CARAMBA*</b><br>Metkonazol 6%  | <b>1,5 l/ha</b>        | J, PŠ, R, T | 35 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenova rja, ržena rja<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!   |
| <b>LIBRAX*</b><br>Fluksapiroksad 6,25% + metkonazol 4,5%                        | <b>1,33 – 2,0 l/ha</b> | J, PŠ, R, T | 35 dni | Žitna pepelovka, helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična listna rja, rumena rja, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, listne pegavosti iz rodu Septoria, pšenična listna rja |
| <b>DITHANE DG Neotec*, MANKOZ 75 WG*</b><br>Mankozeb 75%                        | <b>2,0 kg/ha</b>       | PŠ          | 14 dni | Listne pegavosti iz rodu Septoria  |
| <b>DITHANE M-45*</b><br>Mankozeb 80%  | <b>2,0 kg/ha</b>       | PŠ          | 14 dni | Listne pegavosti iz rodu Septoria  |
| <b>PENNCOZEB 75 DG*</b><br>Mankozeb 75%   | <b>2,0 kg/ha</b>       | PŠ          | 28 dni | Listne pegavosti iz rodu Septoria  |
| <b>EMINENT 125 EW*</b><br>Tetrakonazol 12,5%                                    | <b>1,0 l/ha</b>        | PŠ          | 35 dni | Pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka<br>Do začetka cvetenja  |
| <b>FALCON EC 460*</b><br>Spiroksamin 25% + tebukonazol 16,7% + triadimenol 4,3% | <b>0,6 l/ha</b>        | J, PŠ       | 35 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost   |
| <b>FOLICUR EW 250*</b><br>Tebukonazol 25%                                       | <b>1,0 l/ha</b>        | J, O, PŠ, R | 42 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, pepelovke iz rodu Blumeria.<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!<br>Uporaba na durum pšenicah ni dovoljena.           |
| <b>BALTAZAR*</b><br>Tebukonazol 25%   | <b>1,0 l/ha</b>        | J, O, PŠ, R | 42 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria,   |
| <b>ORIUS 25 EW*</b><br>Tebukonazol 25%  | <b>1,0 l/ha</b>        | J, PŠ, R, T | ČU     | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost<br>Fuzarioze v ozimni pšenici tretiramo od konca klasenja do polnega cvetenja.                                   |
| <b>STAR TEBUKONAZOL*</b><br>Tebukonazol 25%                                     | <b>1,0 l/ha</b>        | J, O, PŠ, R | 42 dni | Ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria, fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, žitna pepelovka  |

|   |                       |                    |        |  |
|---|-----------------------|--------------------|--------|--|
| <b>TEBUSA 25%<br/>EW*</b><br>Tebukonazol 25%                      | <b>1,0 l/ha</b>       | J, PŠ, R, T        | 35 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia   |
| <b>KEYPRO*</b><br>Ciprokonazol 10%                                | <b>1,0 l/ha</b>       | PŠ                 | 35 dni | Listne pegavosti iz rodu Septoria, rje iz rodu Puccinia<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!   |
| <b>MAGNELLO*</b><br>Difenokonazol 10%<br>+ tebukonazol 25%        | <b>1,0 l/ha</b>       | PŠ                 | ČU     | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev<br>Sredstvo je dovoljeno uporabljati le, ko so na rastlinah prisotne pšenične listne pegavosti!   |
| <b>COMRADE*</b><br>Azoksistrobin 20%<br>+ ciprokonazol 8%         | <b>0,75 l/ha</b>      | J, PŠ              | 42 dni | Pšenična rja, rumena rja, pšenična listna pegavost.<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice!<br>Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se površina posuši.  |
| <b>MIRADOR FORTE*</b><br>Azoksistrobin 6% +<br>tebukonazol 10%    | <b>1,5 - 2,0 l/ha</b> | J, PŠ, T           | 35 dni | Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost<br>Tretiramo do konca cvetenja.  |
| <b>OPUS 1*</b><br>Epoksikonazol 8,4%<br>+ fenopropimorf 25%       | <b>1,0 - 1,5 l/ha</b> | J, O, PR, PŠ, R, T | 35 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, lomljivost žitnih bilk, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka.<br>Obvezno zagotoviti 50 m varnostnega pasu ob vodah!  |
| <b>PRIAXOR EC*</b><br>Fluksapiroksad 7,5% +<br>piraklostrobin 15% | <b>1,5 l/ha</b>       | J, PŠ, R, T        | 35 dni | Helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, rumena rja, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja  |
| <b>PROSARO*</b><br>Protiokonazol 12,5% +<br>tebukonazol 12,5%     | <b>1,0 l/ha</b>       | J, PŠ, R, T        | 35 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia, Samo ob uporabi traktorske škropilnice!   |
| <b>ZANTARA*</b><br>Biksafen 5% +<br>tebukonazol 16,6%             | <b>1,5 l/ha</b>       | J, PŠ, R, T, O     | 35 dni | Pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, temna pegavost pšenice, fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, rženi listni ožig, listna pegavost ječmena, ječmenova ramularijska pegavost, ovsova rja<br>Vstop na tretirano površino je dovoljen 4 dni po tretiranju. |
|   |                       |                    |        |  |

|   |                        |             |        |  |
|---|------------------------|-------------|--------|--|
| <b>RETENGO*</b><br>Piraklostrobin 20%   | <b>1,25 l/ha</b>       | J, PŠ, R, T | 35 dni | Helmintosporiozna pegavost pšenice, rumena rja, ržena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmen. rja, sončni ožig   |
| <b>SEGURIUS XTRA*</b><br>Azoksistrobin 10%<br>+ ciprokonazol 8%<br>+ izopirazam 10% | <b>1,0 l/ha</b>        | J, PŠ       | 35 dni | Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenič. rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja.<br>Samo ob uporabi traktorske škropilnice! |
| <b>SPHERE 535 SC*</b><br>Ciprokonazol 16% + trifloksitrobin 37,5%                   | <b>0,5 l/ha</b>        | J, PŠ       | 35 dni | Pšenič. listna pegavost, pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmen. listni ožig, ječmen. pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja  |
| <b>TAZER 250 SC*</b><br>Azoksistrobin 25%   | <b>0,8 l/ha</b>        | J, PŠ       | 35 dni | Fuzarioza korenina, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničn. plev, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja                                       |
| <b>TOPSIN – M*</b><br>Tiofanat-metil 70%  | <b>1,1 kg/ha</b>       | PŠ, T       | 42 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice  |
| <b>ZAMIR*</b><br>Prokloraz 26,7% + tebukonazol 13,3%                                | <b>1,5 l/ha</b>        | J, PŠ, R, T | 35 dni | Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja  |
| <b>COSAN* = VINDEX 80 MG*</b><br>Žveplo 79,6%                                       | <b>5,0- 7,5 kg/ha</b>  | J, R, PŠ, T | 35 dni | Pepelovke iz rodu Erysiphe (žitna pepelovka), <b>za EKO</b><br>Sredstvo se uporablja preventivno.  |
| <b>KUMULUS DF* = THIOVIT JET*</b><br>Žveplo 80%                                     | <b>5,0- 7,5 kg/h</b>   | J, PŠ, R, T | 35 dni | Pepelovke iz rodu Erysiphe, <b>za EKO</b><br>Sredstvo se uporablja preventivno   |
| <b>MICROTHIOL SC*</b><br>Žveplo 82,5%   | <b>5- 7,5 l/ha</b>     | J, PŠ, R, T | 35 dni | Žitna pepelovka<br>Sredstvo se uporablja preventivno<br><b>za EKO</b>  |
| <b>MICROTHIOL SPECIAL*</b><br>Žveplo 80%  | <b>5,0 - 7,5 kg/ha</b> | J, PŠ, R, T | 35 dni | Pepelovke iz rodu Erysiphe<br>Sredstvo se uporablja preventivno<br><b>za EKO</b>   |
| <b>PEPELIN*</b><br>Žveplo 79,6%   | <b>5,0- 7,5 kg/ha</b>  | J, PŠ, R, T | 35 dni | Pepelovke iz rodu Erysiphe, <b>za EKO</b><br>Sredstvo se uporablja preventivno   |
| <b>BUZZ ULTRA DF</b><br>Tebukonazol 75%   | <b>0,33 kg/ha</b>      | PŠ          | 35 dni | Rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, fuzarioza ,pšenična listna pegavost   |

|  |               |                |           |   |
|--|---------------|----------------|-----------|---|
| <b>ELATUS ERA</b><br>Benzovindiflupir<br>7,5% +<br>protiokonazol 15% | <b>1 l/ha</b> | J,PŠ,R,T       | 42<br>dni | Rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, fuzarioza |
| <b>ELATUS PLUS</b><br>Benzovindiflupir<br>10%                        | <b>1 l/ha</b> | J,PŠ,R,T       | 42<br>dni | Rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenja pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova mrežasta pegavost                           |
| <b>MIRADOR 250 SC</b><br>Azoksistrobin 25 %                          | <b>1 l/ha</b> | J,PŠ,R,T       | 35<br>dni | Rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig   |
| <b>ORTIVA</b><br>Azoksistrobin 25 %                                  | <b>1 l/ha</b> | J,PŠ,R,T       | 35<br>dni | Rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig   |
| <b>SILTRA XPRO</b><br>Biksafen 6% +<br>Protiokonazol 20%             | <b>1 l/ha</b> | J,PŠ,R,T,<br>O | 35<br>dni | Fuzarioza, helmintosporioza kliničnih listov, lomljivost žitnih bilk, progavosti iz rodu Pyrenophora, rje iz rodu Puccinia, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, žitna pepelovka      |
| <b>ZAFTRA AZT 250 SC</b><br>Azoksistrobin 25 %                       | <b>1 l/ha</b> | J,PŠ,R,T       | 35<br>dni | Rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig   |

LEGENDA: J – ječmen, O – oves, PŠ – pšenica, PR – pira, R- rž, T – tritikala, ČU – karencja zagotovljena s časom uporabe. FFS \* - varstvo voda, upoštevanje varnostnega pasa ob vodah, za EKO – dovoljen v ekološki pridelavi; Pripravila: A. Poženel, 20.4. 2018