

## SEZNAM HRBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2018

### SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVLOV, 3.5. 2018

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE
<b>STOMP AQUA</b>  Pendimetalin - 45,5%	3,3 l/ha	<b>Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista. Zatira travne plevele in nekat. širokolistne plevele</b>	Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadelati !
<b>ACTIVUS 40 WG</b>  Pendimetalin - 40%	4 kg/ha	<b>Pred vznikom in takoj po vzniku koruze, Zatira travne in na nekatere širokolistne plevele</b>	Ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, seme mora biti dobro pokrito
<b>SHARPEN 40 SC</b>  Pendimetalin - 33%	3 – 5 l/ha	<b>po setvi, vendar pred vznikom koruze Zatira enoletne ozkolistne in širokolistne plevele</b>	Slabo zatira slak
<b>FRONTIER X2 *</b>  dimetenamid - P -72 %	1 – 1,4 l/ha	<b>Pred ali po vzniku koruze, pred vznikom plevelov ! Zatira enoletne travne plevele, delno širokolistne (ščir),</b>	Uporaba na luhkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana ! Boljši v kombinaciji.
<b>DUAL GOLD 960 EC *</b>  <b>EFICA 960 SC*</b> metolaklor-s - 96 %	<b>1 – 1,5 l/ha pred vznikom 1 – 1,3l/ha po vzniku</b>	<b>pred in po vzniku do 2. listov koruze; Zatira enoletne ozkolistne,delno širokolistne plevele</b>	ni za kisla tla pod pH 5,2 Na VVO le po vzniku posevka
<b>PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC *</b> metolaklor-s -31,255+ terbutilazin -18,75%	4 – 4,5 l/ha	<b>Pred in po vzniku do 2. lista koruze</b>  <b>Zatira travne in širokolistne plevele</b>	ni za vodozbirna območja, oz. le po vzniku posevka. Učinkovito zatira ambrozijo.
<b>KOBAN TX</b>  Petoksamid -30% + terbutilazin- 18,75%	4 l/ha	<b>Pred in po vzniku do 4. lista koruze</b>  <b>Zatira širokolistne in ozkolistne plevele</b>	Slabo deluje na slak Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 10 m od meje brega voda 2. reda. Kolobarne omejitve!
<b>MERLIN FLEXX</b>  Izoksaflutol - 24 %	<b>0,3 l/ha – pred vznikom 0,4 l/ha po vzniku</b>	<b>Po vzniku do največ 3. lista koruze</b>  <b>Zatira enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevele</b>	seme mora  biti dobro pokrito

<b>TERANO WG 62,5 *</b>  Flufenacet- 60% + metosulam -2,5%	<b>1 kg/ha</b> <b>Po vzniku dodamo MOČILO!</b>	<b>Pred in po vzniku koruze do 3 listov</b>  <b>Zatira enoletne travne in nekatere širokolistne pleveli</b>	Dobro deluje na preslico, če je veliko travnih plevelov dodamo graminicid  Zaloge v uporabi do 22.6.2018
<b>SUCCESSOR 600 PRO *, SUCCESSOR 600*</b>  petoksamid- 60%	<b>2 l/ha</b>	<b>pred in po vzniku koruze do 4. lista,</b>  <b>Zatira travne in širokolistne pleveli</b>	potrebna zadostna talna vlaga
<b>LUMAX *</b>  Mezotriion-3,75 %+metolaklor-s -37,5 % +terbutilazin -12,5	<b>3 – 4 l/ha</b>	<b>Pred vznikom do največ 4. lista koruze!</b> <b>Zatira enoletne širokolistne in travne pleveli</b>	Pred vznikom izven VVO, nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito zatira <b>ambrozijo</b> .
<b>ADENGO, ADENGO 315 SC</b>  Izoksaflutol-22,5%+ tienkarbazon metil-9%	<b>0,44 l/ha</b>	<b>Pred ali po vzniku koruze do 3.listu koruze</b>  <b>Zatira enoletne široko in ozkolistne pleveli</b>	Zatira lobodo, metliko,dresni – ščavje,pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,..
<b>CALLISTO 480 SC</b>  mezotriion -48%	<b>0,25– 0,3 l/ha pred vznikom</b> <b>0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo</b>	<b>Pred in po vzniku do faze 8 listov pri koruzi,</b>  <b>za zatiranje širokolistnih plevelov</b>	tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in <b>ambrozije</b>
<b>CAMIX *</b>  Mezotriion- 4%+ S-metaloclor- 40%	3,75 l/ha (pri močni zaplevljenosti dodamo MOČILO)	<b>Pred in po vzniku do faze 2. lista koruze.</b> <b>Za zatiranje enoletnih travnih in širokolistnih plevelov</b>	Varnostni pas ob vodah 1. in 2. reda je 20 m ! Zaloge v uporabi do 10.4.2019
<b>BORDER 480 SC*</b>  Mezotriion – 48%	<b>0,3 L/ha pred vznikom</b>  <b>0,2-0,25 L/ha po vzniku + močilo</b>	<b>Po vzniku uporaba do faze 2 razvitih listov koruze.</b>  Za zatiranje srhodlakavega ščira, plezajoča lakota, navadni slakovec in navadna kostreba.	Tretiranje največ 1x v rastni dobi. Ob stresu povzroči prehodne kloroze.  Zaloge v uporabi do 29.1.2019

*Pripravila: A. Poženel, univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;*

*Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.5.2018, MKGP, URSVHVVR*